

大麻的危害

來源：基源植物為印度大麻(Cannabis Sativa L.var Indica Lamarck)生長於溫帶或熱帶氣候。在印度、北非、墨西哥等地皆有生長。

特徵：一年生植株為單一經草本，主根明顯；多年生植株形如灌木，以枝及根鬚為主；莖直立，密生細柔毛，掌狀深裂複葉，互生具長葉柄，莖下部葉對生，小葉 3~9 枚，針形先端尖邊緣粗鋸齒，上下表皮有鐘乳體及腺毛。雌雄異株。

主要成分(Tetrahydrocannabinoid,THC) 富含於葉及雌花。大麻植物頂端之樹脂分泌物乾燥之大麻製劑，在中東及北非地區稱為 Hashish，遠東地區稱 Charas，為含大麻酚濃度最高者。大麻的別名還包括了：「草根」，「壺」，「水手釘」與「海草」。

吸食影響：一般所習稱的「大麻」，通常係指大麻葉乾燥後捲成香煙或混入煙草以供吸食，或是經煉製產生用來塗抹在香煙頂端的大麻油脂這幾種使用型態而言。大麻作為一種藥物而被加以利用的成分，主要存在於葉與花的部分，大麻葉尖所分泌的樹脂以及雌花的頂端，更是富含這種叫做 THC (Tetrahydrocannabinol) 的成分。THC 是一種具有迷幻效果的化學物質，能夠影響人類的神經系統，使人類腦部信息傳遞的方向、速度及幅度產生變化，造成時間和空間的感官訊息扭曲現象；所以吸食大麻會使人產生快感及奇妙的幻想。

使用毒害：使用初有欣快感，劑量增加會引起懶散、意識混亂、無方向感、時扭曲、動作協調差、記憶、思考、注意力、判斷力下降，稱為「動機缺乏症」。在生理上會造成頻脈、發汗、眼結膜紅腫、步履不穩、眼球震盪等影響。較強之 Hashish 製劑常有幻覺及精神病反應。精神分裂症病人如吸食大麻則會使精神病症狀加劇。大麻被認為是海洛因、古柯鹼等強烈藥物中毒者的入門藥物，常與酒精合併濫用。

美國海軍利用飛行模擬器進行了實驗。那些專業飛行員在吸了一支大麻煙之後的 24 小時，犯下了嚴重的失誤；沒有一個人能夠把飛機對準跑道降落，甚至有一個人降落到跑道邊。但是他們都聲稱自己覺得狀況很好。

大麻煙對肺部危害大

1 支抵 5 支普通煙

2007 年 08 月 02 日 11:31

紐西蘭醫學研究所 7 月 31 日發表的一項研究成果表明，1 支大麻煙對人體肺部的危害最大，相當於 5 支普通香煙，但長期吸食大麻不會增加患肺氣腫的幾率。

研究稱，吸食大麻與吸普通香煙都會造成喘息、咳嗽和痰多症狀，而且吸食大麻還多了胸悶這一症狀。研究證明，1 支大麻煙對肺部造成的危害相當於 2.5 支至 5 支香煙的危害。

研究還表明，長期吸食大麻還可能引發氣喘病和支氣管炎。此外，吸食大麻還會損傷一些小氣管，這些氣管在吸入氧氣、排出廢氣方面發揮著重要作用，而損傷程度與吸食量成正比。

吸食大麻開啟了吸毒的大門

「抽大麻煙變得越來越無聊，」一位以前曾染上毒癮的人說，「一陣子之後，產生的作用就沒有那麼的強了。」因此，很多抽大麻的人最後以針筒注射來尋求新的感官刺激。

一些權威人士預測，開始抽大麻的年齡越早，進而使用其他非法毒品的可能性越高。「在 17 歲前使用大麻的人當中有 75% 接著使用其他非法毒品，然而，在 17 歲之後才使用大麻的人當中，有 34% 的人轉而使用其他非法毒品。」

\$ 檢舉獎金 \$

大麻為第 2 級毒品，依防制毒品危害獎懲辦法規定，檢舉意圖供製造毒品之用，而栽種罌粟、古柯、大麻，查獲未滿 10 株者，每株發給新台幣 500 元；10 株以上未滿 100 株者，每株發給新台幣 600 元；100 株以上未滿 1 千株者，每株發給新台幣 700 元；1 千株以上者，每株發給新台幣 800 元，但最高不得逾新台幣 2 百萬元。請民眾踴躍檢舉。

反毒標語

※改造環境生活，從事正當休閒，讓毒害無法侵入。

※生命原本多彩多姿，請勿讓毒品腐蝕生命。