

毒品簡介

FM2(中樞神經抑制劑)：俗稱強姦藥丸，服用後步履蹣跚，心神恍惚，記憶力減退，運動失調。長期服用會產生心理與生理的依賴，不服會產生焦慮、憂鬱、躁動、失眠、心悸等症狀。

安非他命：服用後舉止唐突，脈搏加速食慾減退，瞳孔放大。長期服用會產生失眠、急躁不安、心情抑鬱、注意力不集中、妄想、甚至腦、胃出血死亡等狀。

強力膠：服用後興奮、飄浮感、說話模糊、步態不穩。長期服用會產生神智不清、智能缺損等腦性病變、貧血、心律不整、心跳猝停而死亡。

速賜康：服用後暈眩、多汗噁心、心悸與高血壓。長期服會產生焦慮、侷促不安、癲間、視幻覺等症。

紅中、白板、青發：服用後精神弛怠、平衡感與判斷力喪失、言語發生障礙、晚間睡覺會發生夢遊。長期服用會產生焦慮、極度想睡、注意力分散、精神錯亂等症狀。

鴉片、海洛英、嗎啡：服用後精神弛怠、平衡感與判斷力喪失、言語發生障礙、噁吐、瞳孔萎縮。長期服用會產生體重減輕、短時間間隔性攻擊欲、食慾減退、便秘、性無能、軟弱無力、急於想要依賴藥物等症。

服用毒品的症狀

吸毒者在服用毒品後，會一陣茫然並產生幻覺而脫離現實，因此吸毒者在工作的責任感是渾然無知的，並且不能察覺也不會處理緊急狀況，因為他早已不知「神遊」到何處去了。吸毒者或多或少不會察覺他生活週遭所進行的事物，他老是出差錯或明顯地出現非理性的行為舉止。曾吸過毒的人可能有麻木無感覺的狀況，他們會產生健忘或失去理性；呆滯或變得冷漠無情。

吸食毒品者會呈現分裂的狀態，也就是說，他與他所做的任何事脫節，不管發生任何事都似乎與他無關。他對自己的行為或任何事沒有責任感。他會非常的邪惡或沒有理性的殘酷，他的情緒或多或少是緊閉的，這些狀況甚至在他吸食毒品一段長時間後仍舊持續發生。

一個人習慣性的吸毒或酗酒，是因為他有些不想經歷的痛苦感覺或不好的情緒，此人當有不愉快的感覺，就會以嗑藥或酗酒當作一種治療。

要去了解吸毒的原因，就需要去了解他們在吸毒以前究竟是那裡出錯了？毒品可以讓一個人脫離他無法忍受的現狀或完全失去意識。

根據證據顯示：毒品阻礙學習。就學習的效率來看，一個服用過毒品的人比沒吸毒的人，在學習時相對比較慢。毒品會使人在學習時受到阻礙，有人甚至被稱之為「藥品性格」。

吸安後腦出血 男子失明

台中市一名三十歲男子曾經吸食安非他命，日前和朋友聚會小酌時吸毒，竟使得腦血管破裂，血塊壓迫視覺皮質，造成雙目失明，視力至今尚未恢復。

於該男子喝了酒，家屬擔心他是誤喝假酒，連忙送到台中榮總，抽血檢測得知他有酸中毒，立刻洗腎，但他血中驗不到甲醇，連乙醇濃度都很低，顯然與假酒無關。

後來從電腦斷層攝影掃描發現他腦部有多發性的出血，形成兩個五公分大的血塊，血塊壓迫視覺皮質，才是他失明的主因。

洪東榮說，原來這位男子以前經常吸食安非他命，努力戒斷後，和朋友聚會時，忍不住又破戒，在飄飄然之際，突然腦出血，意識昏昏沈沈。朋友以為這男子還陶醉其中，把他送到住家附近後自行離去。

洪醫生說，這男子腦部血塊若能自行吸收，視力可望恢復，因此現在仍在觀察中。