

台北市衛生局分析近三年感染愛滋的個案資料發現，14 歲至 25 歲的年輕族群比例明顯上升，台北市衛生局疾病管制處副處長林國甯指出，民國九十八年台北市感染愛滋者，有 60 人年齡介於 14 至 25 歲，於所有感染人數 256 人中占兩成三；九十九年略增至 69 人，在所有感染人數 299 人中仍約占兩成三；民國一百年，此年齡層感染人數突破百人，有 102 人感染，於整體感染人數 342 人中所占的比例也增至兩成九。

愛滋病可以投藥預防嗎？

愛滋是一個讓人聞風喪膽的疾病。近來網路流傳，愛滋可以用預防性投藥來避免感染，讓人相信只要吃藥就可以不得愛滋，這是真的嗎？事實上，就某部份而言，預防性投藥的確可以對愛滋有某種程度的預防，但若只有服藥，在行為上卻未能注意安全，仍有感染愛滋的風險。

所謂的預防性投藥可分為兩種，一種是接觸後的預防性投藥（簡稱 PEP），另一種是接觸前的預防性投藥（簡稱 PrEP）。但目前不論是 PEP 或 PrEP，都是具爭議性的預防方式，主要因素除了預防的能力並非 100% 防護，藥物價格昂貴也是未能大力推廣原因。

接觸後的預防性投藥(PEP)可再分為兩種，一種是職業性感染後的投藥，另一種是非職業性感染後的投藥。職業性感染後的投藥，常發生在從事高風險的醫療人員，以針扎後的處理為最常見。

感染愛滋有何症狀？

患者在 HIV 感染後，愛滋病毒將侵犯 CD4 細胞導致免疫機能缺失，由於免疫系統發生了變化，因此易併發各種感染，特別是伺機性的感染，或衍生出各種腫瘤，例如卡波西氏肉瘤。一個 HIV 患者，他的某些身體部位較容易呈現

出一些臨床上的訊息，例如：

- 1.肺：**常見的病變有奴卡氏菌感染、肺囊蟲肺炎、真菌組織孢子菌感染、肺結核、非典型肺結核、麴菌病、隱形球菌感染、弓形蟲感染、退伍軍人症、赤球菌感染、細菌性肺炎、巨形細胞病毒肺炎、腸類圓蟲感染，以及淋巴性間質肺炎（小孩居多）、非感染性的淋巴腫瘤、卡波西氏肉瘤等。
- 2.生殖器官：**因為愛滋病為性病的一種，所以和性病有相同感染途徑的疾病都有可能感染，例如生殖器人類乳頭瘤病毒感染、淋病、陰道炎、疱疹、梅毒、子宮頸炎、尿道炎。
- 3.皮膚：**常見的包括，卡波西氏肉瘤、黴菌感染、皮膚出疹、帶狀疱疹、尖性溼疹、血管炎、感染性軟疣、毛囊炎、皮膚疥狀物、單純性疱疹、皮脂性皮膚炎。
- 4.中樞神經系統和眼睛：**常見的有非典型結核、結核、隱形球菌、弓形蟲、疱疹病毒、黴菌、巨形細胞病毒、愛滋病毒病毒感染，特別是巨形細胞病毒視網膜炎，它亦可以發生原發性之腦部淋巴腫瘤。
- 5.口腔和消化道：**常見的有，齒齦炎、黴菌感染、口腔卡波西氏肉瘤、單純性疱疹、口腔潰瘍、口腔疥狀物、牙齒化膿、舌頭毛狀白斑、吞嚥疼痛反困難。食道常見的有，巨型細胞病毒感染、黴菌感染、單純性疱疹、食道潰瘍。胃腸道常見的有同形孢子蟲或微細胞子蟲感染、體重減輕、隱形孢子蟲感染、單純性疱疹或巨形細胞病毒感染、非典型結核菌感染，有時甚至有卡波西氏肉瘤、淋巴瘤等病變，而且其內常見有化膿、疥物、疱疹、下疳、潰瘍等現象。
- 6.其他：**原因不明的體重減輕等虛脫症候、次發性惡性腫瘤。

資料來源：國家網路醫院