

春暉專刊

NO.102

中華民國 91 年 9 月 4 日創刊 學務處生教組製 吳淑美 李建忠 老師編輯

常見毒品毒性與分級

第一級毒品

鴉片 Opium(俗名：福壽膏、芙蓉膏)

毒品來源：罌粟 (Papaver Somniferum) 未成熟蒴果經割傷果皮後，滲出之白色乳汁乾燥凝固而得。含鴉片生物鹼約 25 種。

毒品性狀：形狀不一，呈圓球形、扁餅形、磚塊或不規則形，呈棕色或黑色，俗稱阿芙蓉或福壽膏。

濫用方式：以附煙袋鍋之長管抽吸。

使用毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成急性中毒，症狀包括昏、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒治。



嗎啡 Morphine(俗名：魔啡)

毒品來源：由鴉片提煉出的白色粉末。

毒品性狀：具光澤無臭味苦之極微細白色針狀結晶粉末。通常裝入小紙如包裝般包裝或以封口塑膠袋方式流通市面。

濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。

使用毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成慢性中毒，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒治。



海洛英 Heroin(俗名：白粉、四號、查某、鹹仔、軟仔)

毒品來源：嗎啡與醋酸酐加熱反應成為海洛因。

毒品性狀：成分為高純度海洛因 Heroin，呈塊狀白色結晶。

濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。

使用毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。具高度心理及生理依賴性，長期使用停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。



古柯鹼 Cocaine(俗名：可卡因、快克、Crack、Snow)

毒品來源：由古柯葉提煉而得，哥倫比亞、秘魯、玻利維亞、古巴為主要產地。美國及中南美洲為主要濫用地區。

毒品性狀：鹽酸古柯鹼 (cocaine HCl) 為無色或白色薄片狀結晶性粉末，味苦，具舌麻痺感，又稱為可卡因。

濫用方式：鼻吸、吸煙。

使用毒害：使用後產生興奮、發抖、心跳加速、血壓上升、被害妄想、幻覺。大量使用引起精神錯亂思想障礙，長期使用引起失眠、躁動或妄想性神經病。過量引起呼吸抑制。停藥之脫癮症狀與安非他命類似，包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱，有自殺的傾向。



資料來源：法務部戒毒資訊網 <http://refrain.moj.gov.tw/html/index.php>
行政院衛生署管制藥品管理局 <http://www.nbcd.gov.tw>



第二級毒品

安非他命 Amphetamine(俗名：安公子、安仔、炮

仔、糖仔、冰塊、冰糖、鹽、硬仔、查埔)

毒品來源：由鹽酸麻黃素合成。國內濫用之安非他命主要為甲基安非他命。

毒品性狀：純品為無色至淡黃色油狀物，其鹽酸鹽或硫酸鹽為微帶苦味之白色結晶體粉末。甲基安非他命鹽酸鹽結晶如細碎冰塊，目前市面流通之包裝已由保濟丸瓶裝改為封口小塑膠袋裝。

濫用方式：口服、注射或鼻吸或與菸草混合後抽吸。

使用毒害：興奮中樞神經，雖具有欣快、警覺及抑制食慾之作用，重複使用會成癮，中毒症狀包括多話、頭痛、錯亂、高燒、血壓上升、盜汗、瞳孔放大、食慾喪失。大劑量使用引起精神錯亂，思想障礙，類似妄想性精神分裂症，多疑、幻聽、被害妄想等，長期使用導致器官性腦症候群。有高血壓及腦中風之危險。停用之脫癮症狀包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱，有自殺之傾向。



大麻 Cannabis(俗名：草、麻仔、老鼠尾、飯)

毒品來源：基源植物為印度大麻生長於溫帶或熱帶氣候。

毒品性狀：主要成分富含於葉及雌花。大麻植物頂端之樹脂分泌物乾燥之大麻製劑，在中東及北非地區稱為 Hashish，遠東地區稱 Charas，為含大麻酚濃度最高者。

濫用方式：吸煙或煙斗抽吸。

使用毒害：使用初有欣快感，劑量增加會引起懶散、意識混亂、無方向感、時扭曲、動作協調差、記憶、思考、注意力、判斷力下降，稱為「動機缺乏症」。在生理上會造成頻脈、發汗、眼結膜紅腫、步履不穩、眼球震盪等影響。較強之 Hashish 製劑常有幻覺及精神病反應。精神分裂症病人如吸食大麻則會使精神病症狀加劇。大麻被認為是海洛因、古柯鹼等強烈藥物中毒者的入門藥物，常與酒精合併濫用。



搖頭丸 MDMA(俗名：快樂丸、狂喜、忘我、綠蝴蝶、亞當、衣服、E)

毒品來源：為亞甲雙氧甲基安非他命之簡稱。為安非他命類似物質。

毒品性狀：白色藥片、膠囊，亦有粉紅色或其他顏色。

濫用方式：口服。

使用毒害：興奮中樞神經並具迷幻作用。食慾不振、牙關緊閉、噁心、肌肉痛、運動失調、流汗、心悸、疲倦及失眠。引起之毒性包括體溫過高、血管疾病、心律不整。致命的毒性包括橫紋肌溶解、散佈性血管內凝集及急性腎衰竭。體溫過高為 MDMA 中毒主要特色，可高達攝氏 43 度，由於藥物作用加上脫水及身體奮力而造成的高體溫可致死。與安非他命及古柯鹼同，會產生心理依賴造成強迫性使用，引致抑鬱及精神錯亂，亦時有惶恐不安感，甚至自殺之傾向。由於中樞神經抑制能力減弱，易產生不會受傷害的幻想，濫用者往往對行為能力的安全性掉以輕心，造成意外。



***** 諮詢及戒治資訊 *****

衛生署管制藥品管理局 (藥物濫用防治)

*(02) 2397-50 分機 2121 * <http://www.nbcd.gov.tw>

衛生署醫事處第四科(藥癮戒治) (049) 2332161 分機 321

中華民國反毒運動促進會 *(02) 2381-5225

台北市少年輔導委員會 *(02) 2346-7601

台灣更生保護會總會 *(02) 2737-1232

各縣市救國團張老師中心