

向毒品 say NO (上)

常見毒品分級

第一級：海洛英、古柯鹼、嗎啡…。

第二級：安非他命、大麻、搖頭丸、一粒沙、白板…。

第三級：K 他命、FM2、紅中、青發…。

第四級：火狐狸、蝴蝶片、安定…。

第一級毒品

*** 海洛英 Heroin** 毒品類別：麻醉藥品

毒品別名：白粉、四號

濫用方式：注射、口服、吸入

服用症狀：症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。使用初有感覺愉快安靜，無法集中精神，會產生夢幻現象。12 小時後，身體由於得不到麻醉劑而不能正常運作，即時出現緊張、無法入睡、出汗、腸胃不適、四肢疼痛及痙攣等斷癮症狀。這症狀持續三到五天。濫用越久，斷癮症狀越長。過量使用造成急性中毒，具高度心理及生理依賴性，上癮的人因身體對它有適應性，會不斷增加份量以得到相同的效果。長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症，成癮後極難戒治。



*** 古柯鹼 Cocaine** 毒品類別：興奮劑

毒品別名：可卡因、快克

濫用方式：菸吸、鼻吸

服用症狀：興奮、瞳孔擴散、不安、焦躁、發抖、強烈地精神依賴、精神混沌、目眩、感情抑制、痙攣、死亡。吸食初期會產生欣快感、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺，使用劑量增加後則會產生視幻覺、觸幻覺、聽幻覺、感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀。使用過量會產生胡言亂語、呼吸衰竭、心臟麻痺，甚至導致死亡。懷孕婦女長期使用古柯鹼會造成流產、早產、胎兒體重過輕、腦部發育受損等情況。



*** 嗎啡 Morphine** 毒品類別：麻醉藥品

毒品別名：魔啡

濫用方式：口服、鼻吸、注射、抽吸

服用症狀：初始有快感、無法集中精神，會產生夢幻的現象。因中樞神經抑制，而產生幸福感和陶醉感，身體調節功能喪失，瞳孔縮小，眼淚、鼻涕、惡寒、發汗、食慾減退、嗜睡、失眠、呆滯、體重減輕。高劑量的嗎啡容易導致呼吸抑制、血壓下降、昏迷。之後會產生精神性依賴，身體上依賴，戒斷症狀：感染、膿瘍、破傷風、肝炎、呼吸麻痺、死亡（過量使用時）。



***** 諮詢及戒治資訊 *****

衛生署管制藥品管理局（藥物濫用防治）* <http://www.nbcd.gov.tw>

衛生署醫事處第四科（藥癮戒治）* (049)2332161 分機 321

中華民國反毒運動促進會 * (02)2381-5225

台北市少年輔導委員會 * (02)2346-7601

台灣更生保護會總會 * (02)2737-1232

第二級毒品


*** 安非他命 Amphetamine**

毒品類別：興奮劑

毒品別名：安公子、安仔冰糖、冰塊、鹽、Speed

濫用方式：口服、注射、鼻吸、抽吸

服用症狀：猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重複性的行為及睡眠障礙等，伴有自殘、暴力攻擊行為等。成癮後一旦停止吸食，便會產生戒斷症狀，疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力，嚴重者甚至出現自殺或暴力攻擊行為。



*** 大麻 Cannabis** 毒品類別：迷幻劑

毒品別名：老鼠尾巴、草、飯、麻仔

濫用方式：吸菸

服用症狀：眼球出血、口腔乾燥、好辯（話多）、笑、陶醉感、幻覺、時間及空間歪、錯亂之知覺。精神依賴之可能性，因空間歪曲而造成意外。長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症、精子減少、精子活動減退及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」。懷孕婦女吸食大麻常會造成早產、胎兒體重偏低。大麻有成癮性，且就像香菸一樣，吸食者罹患癌症的機率都較高。



*** 搖頭丸 MDMA** 毒品類別：興奮劑

毒品別名：快樂丸、搖頭丸、綠蝴蝶

亞當、狂喜、忘我、Ecstasy

濫用方式：口服

服用症狀：精神症狀如混淆不清、抑鬱、求藥物、嚴重焦慮、在使用期間或數週後產生誇大妄想等；生理症狀有食慾不振、心跳加快、精力旺盛、運動過度、肌肉緊張、不隨意牙關緊閉、噁心、嘔吐、視力模糊、眼球快速轉動、軟弱無力、寒顫或流汗、疲倦及失眠等。而中毒症狀包括體溫過高（可高達 43℃）、脫水、低血鈉、急性高血壓、心律不整、凝血障礙、橫紋肌溶解及急性腎衰竭等症狀，嚴重者可能導致死亡。



*** 麥角乙二胺 LSD** 毒品類別：迷幻劑

毒品別名：Acid、搖腳丸、一粒沙、ELISA、加州陽光、白色閃光 Broomer、方糖

濫用方式：口服、抽吸、注射

服用症狀：生理上會有瞳孔放大，體溫、心跳及口乾、震顫、噁心、嘔吐、頭痛等現象；情緒及心理上產生快感、判斷力混淆、失去方向感及脫離現實感、錯覺及幻覺，感覺異常，嚴重者還會出現焦慮、恐慌、胡言亂語、精神分裂症、自殘、自殺等暴力行為。若過量會導致抽搐、昏迷，甚至死亡。長時間使用會產生耐受性、心理及生理依賴性，並產生「倒敘現象」- 即使已經很久沒有使用 LSD，但精神症狀或幻覺仍會不預警地隨時發生。



*** 甲酮 Methaqualone**

毒品類別：中樞神經抑制劑

毒品別名：白板、弗得、忽得

濫用方式：口服、注射

服用症狀：長期服用在生理、心理上會產生耐受性、依賴性及禁斷現象，其副作用、成癮性及戒斷症狀均與巴比妥酸鹽類似，服用過量會造成運動失調、暈眩、呼吸困難、低血氧、酸中毒、循環障礙、視覺障礙、昏迷、甚至致死。突然停藥會有戒斷症狀發生，如頭痛、噁心、虛弱、焦慮不安、盜汗、顫抖、腹部疼痛、甚至產生發燒、痙攣、昏迷致死。



.....第三級、第四級毒品介紹下回待續.....