

認識愛滋病的「空窗期」


愛滋病毒感染有一個需要注意的「空窗期」問題，「空窗期」指的是「感染愛滋病毒後，到可以被檢查出來的時間」。在得到愛滋病感染的初期，可能檢驗不出來病患已經得到了愛滋病毒，這就是所謂的「空窗期」，空窗期時，病患感染者體內的愛滋病毒數量多，傳染力強，可以傳染愛滋病給其他的人。在愛滋病毒感染後，人體不會立即產生抗體，因此以一般的抗體檢測，大約要 6-12 週後才能被檢查出來，若以偵測愛滋病毒抗原之檢驗方式，如：1.以愛滋抗原/抗體複合型檢測 (HIV antibody and antigen combination assay) 篩檢，並經中和試驗 (Neutralization test, NT) 確認、2.分子生物學核酸檢

測 (Nucleic Acid Testing, NAT)，可縮短空窗期，並提高愛滋病毒感染早期發現的機會。

那什麼是「潛伏期」？

愛滋病的「潛伏期」是指「感染愛滋病毒後，到發病的時間」。典型愛滋病的潛伏期，從感染到發展成為愛滋病患，快者半年至 5 年，慢者 7 年至 10 年或更久。如果使用藥物控制治療，可以延緩發病，延長潛伏期。因此就時間來看，空窗期和潛伏期並不相同。

愛滋病毒的潛伏期vs.空窗期



愛滋病 空窗期

漫畫/SANA



別忘了有愛滋病風險的人不能捐血呀～
例如：

- ① 沒戴保險套發生一夜情
- ② 共用針頭
- ③ 懷疑自己感染愛滋

你不是還在擔心被感染？



TAIWAN CDC ● 疫情通報及諮詢專線：1922

資料來源：

衛生福利部疾病管制署

<http://www.cdc.gov.tw/diseaseinfo.aspx?treeid=8d54c504e820735b&nowtreeid=dec84a2f0c6fac5b&tid=0D62EE0F6D4EBF8C>